

暖地型芝草に使用出来る選択性除草剤 [1]

選択性	作物名	適用雑草名	使用時期	タイプ	一般名	使用量 10a当たり	散布液量 10a当たり
選択性	日本芝	畑地一年生雑草	秋～春 (芝萌芽前)	茎葉 土壌	アシラム液剤	1000ML ~ 1250ML	200L ~ 300L
			芝生育期 (雑草生育初期)			400ML ~ 600ML	
選択性	芝(ノシバ・コウライシバ・ティフトン)	メヒシバ・スズメノカタビラなどの 一年生畑地雑草(キク科雑草を除く)	春期または秋期の雑草発生前	土壌	アミプロホスメ チル水和剤	500g ~ 1000g	250L ~ 300L
選択性	日本芝(コウライシバ)	畑地一年生雑草	春期雑草発生前	土壌	アラクロール乳 剤	600ML ~ 1000ML	250L
			秋期雑草発生前			600ML ~ 1200ML	
選択性	日本芝	一年生雑草	秋期雑草発生前	土壌	イソキサベン・ トリフルラリン 粒剤	6kg ~ 8kg	
選択性	日本芝	一年生及び多年生広葉雑草	芝生育期 (雑草生育初期)	土壌 茎葉	イソキサベン・ フロスラム液 剤	30g ~ 50g	150L ~ 200L
選択性	日本芝	畑地一年生雑草	秋期～冬期 (雑草発生始期～生育期)	土壌 茎葉	イマザキン・ペ ンディメタリン 水和剤	300g ~ 500g	200L ~ 250L
選択性	日本芝	畑地一年生雑草	芝生育期 (雑草生育期)	茎葉	イマザキンアン モニウム塩液剤	200ML ~ 400ML	250L
		ヒメクゲ ハマスゲ	春期～夏期芝生育期 (雑草生育期)			300ML ~ 500ML	
選択性	日本芝	一年生雑草 多年生雑草 ヒメクゲ ハマスゲ	芝生育期 (雑草発生前～雑草生育初期)	土壌 茎葉	イマゾスルフロ ン・プロジアミ ン水和剤	200ML ~ 300ML	200L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生雑草	春期雑草発生前 (芝生育期)	土壌	インダノファン 水和剤	200g ~ 300g	200L ~ 300L
			秋期雑草発生前 (芝生育期)			150g ~ 300g	
選択性	日本芝	一年生雑草	春期雑草発生前 (芝生育期)	土壌	エトキシスルフ ロン・カフェン ストロール水和 剤	200g ~ 400g	200L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生雑草	春期雑草発生前 (芝生育期)	土壌	オキサジアルギ ル水和剤	100ML ~ 200ML	200L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生イネ科雑草	雑草発生前 (芝生育期)	土壌	オキサジクロメ ホン水和剤	75ML ~ 150ML	200L ~ 300L
選択性	日本芝(コウライシバ)	一年生イネ科雑草	雑草発生前	土壌	オルソベンカー ブ液剤	600ML ~ 900ML	200L ~ 300L
						600ML ~ 900ML	200L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生イネ科雑草	雑草発生前	土壌	カフェンスト ロール水和剤	200g ~ 400g	200L ~ 300L


 **タキイ種苗株式会社**

Copyright (C) TAKI I&CO., Ltd. 2004

本ページに掲載されている全てのコンテンツ(記事・画像など)は
タキイ種苗株式会社の承諾なしで無断転載することを禁じます。

暖地型芝草に使用出来る選択性除草剤 [2]

選択性	作物名	適用雑草名	使用時期	タイプ	一般名	使用量 10a当たり	散布液量 10a当たり
選択性	日本芝	一年生雑草	雑草発生前 (芝生育期)	土壌	カフェンスト ロール・シノス ルフロン水和剤	200g ~ 300g	200L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生雑草	芝生育期 (雑草発生前)	土壌	カフェンスト ロール・ハロス	200g ~ 400g	200L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生雑草	雑草発生前(3葉期まで) (芝生育期)	土壌	カフェンスト ロール・レナシ ル水和剤	200g ~ 400g	200L ~ 300L
選択性	芝(コウライシバ)	畑地一年生雑草	春期雑草発生前 秋期雑草発生前	土壌	クロルフラム 水和剤	400g ~ 600g 600g	300L
選択性	日本芝	畑地一年生雑草	春期雑草発生前	土壌	シアナジン水和 剤	200g ~ 400g	200L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生雑草 一年生イネ科雑草	春期雑草発生前 ~ 発生初期 雑草発生前 春期雑草発生前	土壌	ジチオピル乳剤	100g ~ 200g 150ML ~ 300ML 75ML ~ 150ML	200L ~ 250L 200L ~ 300L
選択性	日本芝	畑地一年生雑草	芝生育期 (雑草発生前) 春期 芝生育期 (雑草発生前) 秋期	土壌	ジチオピル複合 肥料	30kg ~ 60kg 40kg ~ 60kg	
選択性	日本芝	一年生雑草	芝生育期 (雑草発生前)	土壌	ジチオピル・ハ ロスルフロンメ チル水和剤	春期 100g ~ 200g 秋期 150g ~ 200g	200L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生広葉雑草 一年生カヤツリグサ科雑草	雑草発生前 ~ 生育初期	土壌 茎葉	シノスルフロン 水和剤	45g ~ 90g	200L
選択性	日本芝	畑地一年生雑草	秋期芝生育期 (雑草発生前 ~ 生育初期) (スズメノカタビラ2葉期まで)	土壌 茎葉	シンメチリン乳 剤	250ML ~ 350ML	200L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生イネ科雑草	芝生育期 (雑草発生前)	土壌	テニルクロール 水和剤	300g ~ 500g	200L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生雑草	芝生育期 (雑草発生前但し、秋期スズメノカタ ビラは3葉期まで)	土壌	トリアジフラム 水和剤	75ML ~ 150ML	200L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生雑草	芝生育期 (雑草発生前)	土壌	トリアジフラ ム・ハロスルフ ロンメチル水和 剤	75g ~ 150g	200L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生広葉雑草および クローバー・チドメグサ等の多年生広葉雑草	雑草生育期	茎葉	トリクロピル液 剤	200ML ~ 600ML	150L ~ 200L
選択性	日本芝	一年生および多年生広葉雑草	雑草生育初期 ~ 生育盛期	茎葉	トリクロピル粉 粒剤	7.5kg ~ 10kg	

 **タキイ種苗株式会社**

Copyright (C) TAKI I & CO., Ltd. 2004

本ページに掲載されている全てのコンテンツ(記事・画像など)は
タキイ種苗株式会社の承諾なしで無断転載することを禁じます。

暖地型芝草に使用出来る選択性除草剤 [3]

選択性	作物名	適用雑草名	使用時期	タイプ	一般名	使用量 10a当たり	散布液量 10a当たり
選択性	日本芝	一年生イネ科雑草	雑草発生前 (芝生育期)	土壌	ナプロパミド水和剤	400g ~ 600g	200L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生雑草	芝生育期 (雑草発生前)	土壌	ハロスルフロン メチル・プロジ アミン水和剤	200g ~ 300g	200L ~ 300L
	日本芝	広葉雑草 ヒメクグ ハマスゲ	芝生育初期～生育期 (雑草発生前～生育初期)	土壌	ハロスルフロン メチル水和剤	30g ~ 50g	200L ~ 300L
選択性	芝(コウライシバ・ヒメコウライシバ)	畑地一年生雑草(キク科を除く)	秋期雑草発生前	土壌	ブタミホス水和剤	1000g ~ 1200g	250L ~ 300L
選択性	日本芝	畑地一年生雑草(キク科を除く)	春期または秋期 (雑草発生前)	土壌	ブタミホス乳剤	春期 ~ 1200ML 600ML 秋期 ~ 550ML 350ML	250L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生雑草 多年生広葉雑草 ヒメクグ ハマスゲ	春～夏	茎葉	フラザスルフロン 水和剤	25g ~ 50g	150L ~ 200L
		一年生雑草 多年生広葉雑草 スギナ	秋～冬			50g ~ 100g 25g ~ 50g 50g ~ 75g	
選択性	芝(コウライシバ・ヒメコウライシバ・ノシバ・バミュダグラス)	畑地一年生雑草	雑草発生前	土壌	プロピザミド水和剤	400g ~ 600g	200L ~ 300L
選択性	日本芝	畑地一年生雑草 (キク科雑草を除く)	雑草発生前	土壌	ペンディメタリン水和剤	400g ~ 900g	200L ~ 300L
選択性	芝(コウライシバ・ヒメコウライシバ・ノシバ・ティフトン)	ハマスゲ・ヒメクグ等のカヤツリグサ科雑草 及びイネ科畑地一年生雑草 スズメノカタビラなどの冬生畑地雑草	春期雑草発生前	土壌	メチルダイムロン 水和剤	1000g ~ 2000g	200L ~ 300L
			秋期雑草発生前			500g ~ 1000g	
選択性	日本芝	一年生及び多年生広葉雑草	秋期～冬期 (雑草発生前始期～生育期)	茎葉	メトスルフロン メチル水和剤	2g ~ 4g	150L ~ 200L
選択性	日本芝	一年生雑草	春期～夏期 (雑草発生揃期～生育初期)	茎葉	リムスルフロン 水和剤	7.5g ~ 15g	150L ~ 200L
			秋期～冬期 (雑草発生揃期～生育初期)			5g ~ 7.5g	
選択性	芝(コウライシバ)	スズメノカタビラ等畑地一年生雑草	秋期雑草発生前	土壌	レナシル水和剤	200g ~ 250g	250L ~ 300L
選択性	日本芝	一年生雑草	雑草発生前～始期	土壌	レナシル・P A C水和剤	200g ~ 300g	200L ~ 300L
選択性	日本芝	広葉雑草	芝の生育期	茎葉	2、4 P A液剤	1000g	200L ~ 300L
選択性	日本芝 (コウライシバ)	藻類・コケ類		茎葉	A C N水和剤	3kg ~ 4kg	200L ~ 300L
選択性	芝(日本芝・ティフトン)	畑地一年生雑草	秋期雑草発生前	土壌	CAT水和剤	10kg ~ 15kg	
選択性	芝(日本芝・ティフトン)	畑地一年生雑草	雑草発生前	土壌		200g ~ 300g	250L ~ 300L

 **タキイ種苗株式会社**

Copyright (C) TAKI I&CO., Ltd. 2004

本ページに掲載されている全てのコンテンツ(記事・画像など)は
タキイ種苗株式会社の承諾なしで無断転載することを禁じます。

暖地型芝草に使用出来る選択性除草剤 [4]

選択性	作物名	適用雑草名	使用時期	タイプ	一般名	使用量 10a当たり	散布液量 10a当たり
選択性	芝	畑地一年生雑草	雑草の2～3葉期 雑草の3～4葉期	茎葉	D C P A 乳剤	550ML 500ML～	50L～80L 50L～80L
選択性	日本芝	ヒメクグ スギナ 畑地多年生雑草 畑地一年生広葉雑草	春期芝生育期 (雑草発生前～生育初期)	土壌	D C B N 水和剤	1kg～2kg	150L～200L
		畑地一年生雑草	秋期芝生育期 (雑草発生前～生育初期)			1kg 0.5kg～1kg	
選択性	日本芝	一年生雑草及び多年生広葉雑草 ヒメクグ	秋期雑草発生前～発生始期 ヒメクグ生育初期	土壌	D B N 粒剤	8kg～10kg 10kg～15kg	
選択性	日本芝(コウライシバ・ヒメコウライシバ)	スズメノカタビラなど 冬型イネ科雑草	秋期～春期にかけて気温が 20℃内外の時期 雑草発生前～発生始期	土壌	I P C 乳剤	400g～600g	200L～300L
選択性	日本芝	スズメノカタビラ	秋期雑草発生前 (芝生育期) 秋期雑草発生始期 (芝生育期・スズメノカタビラ 3葉期以内)	土壌	I P C 乳剤	300ML～600ML 400ML～800ML	200L～300L
選択性	日本芝	畑地一年生広葉雑草	雑草生育期	茎葉	M C P P・M D B A・2 4 P A 液剤	400ML～800ML	100L～150L
選択性	芝	一年生及び多年生広葉雑草	雑草生育初期	茎葉	M D B A 液剤	100ML～200ML	100L
選択性	日本芝(コウライシバ・ノシバ)	クローバ・オオバコ・ヤハズソウ等 畑地一年生及び多年生広葉雑草	雑草発生初期～雑草発生盛期	茎葉	M D B A 粒剤	20kg	
選択性	日本芝(コウライシバ)	メヒシバ・オヒシバ等の イネ科一年生雑草	雑草発生前 (2月中旬～4月)(8月下旬～ 11月)	土壌	S A P 乳剤	2L～3L	200L～400L
	芝	一年生イネ科雑草	雑草発生前	土壌			
選択性	芝(日本芝)	広葉雑草	芝の生育期	茎葉	MCPAナトリウム 塩製剤	2,000g	200L～300L

 **タキイ種苗株式会社**

Copyright (C) TAKI I&CO., Ltd. 2004

本ページに掲載されている全てのコンテンツ(記事・画像など)は
タキイ種苗株式会社の承諾なしで無断転載することを禁じます。