

ちょっと
気になる?!


野菜の豆知識

果菜編②

「ロロン」の肥培管理

・元肥80g/10㎡

株元からつるが伸びている
範囲に追肥を施す



↑草勢の強い「ロロン」などの品種は元肥を10㎡当たりチッソ成分で80gを目安にしてください。



↑果実がにぎりこぶし大になったところに追肥を施します。つるが伸びてきている地面に散布してください。

最も重要なポイントはズバリ、元肥量と追肥です。

着果するまでに草勢が強すぎず弱すぎず、着果に適した草勢にするには、元肥の「適量」が重要です。畑の条件にもよりますが、10㎡当たりチッソ成分で100gを基準に元肥を施します。草勢が強めの「ロロン」「ほっこり133」「夢味」「ほっこり姫」は80gを目安に作付けしましょう。追肥は、必ず実施すべきです。着果後に葉で

作られた栄養分は、果実に集中的に分配されるようになります。そこで、果実がにぎりこぶし大になったところを見計らって、速効性の粒状肥料(10㎡当たりチッソ成分30g)を追肥してやると、果実肥大や食味向上の効果が期待できます。

カボチャの根は広く分布するので、株元・つる先問わず、つるが伸びてきている地面に散布します。粒状肥料の養分は、水に溶けて初めて根に吸収されるため、降雨のない場合は散水して肥料分を溶出させましょう。

Q カボチャ栽培で重要なポイントをあげるとすると何ですか？




タキイ研究農場
さかぐち けいたろう
阪口 敬太郎

Q スイートコーン栽培でアワノメイガやカラス被害を防ぐ方法を教えてください。




タキイ研究農場
せの あきよし
瀬野 晃好

防鳥糸を張る



タネをまいた上15cmくらいの高さに糸を張っておく。


防鳥ネットを張る



防鳥ネットをトンネルに張る。

アワノメイガの防除はタイミングが重要です。雄穂の出穂時期に登録のある粒剤を散布します。また、雌穂の出穂終わりごろまでに今度は乳剤などを散布します。これだけでは完全に防除は難しいので、受粉終了後に雄穂を取り除き、できるだけアワノメイガを誘引しないようにすると効果的です。カラス被害を防ぐには草丈程度のところに防鳥糸を張るか、畝全体に防鳥ネットを張る方法などがあります。

絹糸抽出後20～25日ごろが収穫適期



Q スイートコーン収穫のタイミングが分かりません。収穫時期の見極め方を教えてください。

ひげ(絹糸)のしぼみ方では収穫時期を見極めるのは難しいです。正確には絹糸抽出後20～25日ごろが収穫適期ですので、これを目安に試しむきをして収穫しましょう。

Q 秋の端境期にエダマメを直売所に出荷したいのですが、栽培で気を付けることはありますか。



タキイ研究農場
瀬野 晃好


- ① 播種期の厳守 「富貴」を例に夏まき栽培のポイントを見てみましょう。栽培で注意する点は次の5つです。
- ② 栽植密度 春栽培より樹姿はコンパクトになり着莢数が減るので、やや密植で栽培しましょう。
- ③ 施肥量 肥料はチツソ成分で春栽培の7割程度を目安とします。



↑大莢がたくさんつく「富貴」。

- ④ 発芽をスムーズに 夏まき栽培では、播種後の地温の上昇を防ぐため白マルチを用い、発芽が始まるまで敷きわらか黒寒冷紗で覆います。
- ⑤ 灌水管理 播種後約3週間で開花が始まりますので、乾燥による着莢不良を起こさないようしっかりと灌水を行うことが重要です。

夏まき栽培では地温上昇を防ぐ



8月2日播種

「江戸緑」(早生種)は株が小さいままだが、「富貴」、「福獅子」は株ができ、莢付きもよい。

