

コンジンピツコロッのプランター栽培



タネまき

まず、まき床に5mm程度の深さで楽をつけます。発芽のために光が必要なので、 覆土はあまり厚くしないようにしましょう。条間10~15cmの2条まきとし、1 cm 間隔でタネをまきます。



タネまき 後の管理 **水やり** 水は日に何回と決めて与えるのではなく、土の表面が乾いたらたっぷりやるようにします。

その後は、土の表面が乾くまで次の水 やりを控え、根腐れを予防しましょう。

間引き 本葉2~3枚時に株間1.5㎝、本葉5~6枚時には株間3~5㎝に間引きます。間引き後は、株元がぐらつかないよう根元に土寄せしておきます。

追肥 間引きから約2週間後、化成肥料を軽く1つまみ(10g前後)株元に追肥します。その後も2週間おきに、生長の様子を見ながら同じ分量を追肥します。

病害虫対策 主な害虫には、キアゲハの幼虫やアブラムシなどがあります。タネまき後にプランターを「サンサンネット」などで覆い、害虫が入らないよう防除してください。



'ピッコロ'収穫の様子。根のよく太ったものから抜いていく。

タネまき後70~90日で収穫適期になります。根の太いものから選んで収穫するようにしましょう。根長10~12 cm、太さ1.5~2 cmが大きさの目安です。



収穫したミニニンジン 'ピッコロ'。 歯切れよい肉質で生食に最適。

